

«Утверждаю»

Директор

ООО «ДаВинчи»

_____ Шемякин А.Р.

Приложение №1 к преискуранту.

При выполнении ортодонтического лечения в сложных клинических условиях вводятся коэффициенты:

Коэффициент 1.1.

- Дефицит места в пределах одного зубного ряда от 2 до 5 мм при правильном смыкании боковых зубов
- Естественный избыток места в пределах 1 зубного ряда от 2 до 4 мм
- Дистальный или мезиальный прикус со смещением клыков до 2 мм
- Открытый прикус при перекрытии зубов от режущего края до $\frac{1}{4}$ длины нижних зубов
- Ортодонтическое лечение с помощью эстетических брекет – систем в максимальной комплектации (более шести штук)
- Ортодонтическое лечение с установкой эстетических фасеток в области отсутствующих зубов
- Ортодонтическое лечение с временной композитной реставрацией фронтальных зубов.

Коэффициент 1.2.

- Дефицит места в пределах одного зубного ряда от 5 до 8 мм при правильном смыкании боковых зубов
- Дефицит места, требующий удаления боковых зубов (более 8 мм)
- Закрытие естественного избытка места в пределах от 4 до 6 мм
- Закрытие промежутка после удаления зуба на верхней челюсти в процессе ортодонтического лечения при скученности зубов
- Дистальный или мезиальный прикус со смещением клыков от 2 до 4 мм
- Перекрестный прикус со смещением боковых зубов более от 2 до 4 мм

- Открытый прикус при отсутствии перекрытия зубов до 2 мм
- Внедрение отдельных зубов более чем на 1 мм с использованием дополнительных конструкций (микроимплантатов)
- Перемещение отдельных зубов более чем на 3 мм при ортодонтической подготовке к протезированию.

Коэффициент 1.3.

- Закрытие промежутка после удаления зуба на нижней челюсти в процессе ортодонтического лечения при скученности зубов
- Дистальный или мезиальный прикус со смещением клыков более 4 мм
- Перекрестный прикус со смещением боковых зубов более 4 мм
- Вытяжение небно – расположенных ретенированных зубов (кроме 8 – х зубов)

Коэффициент 1.4.

- Закрытие промежутка после удаления зуба на верхней челюсти в процессе ортодонтического лечения при отсутствии скученности зубов
- Открытый прикус при отсутствии перекрытия зубов более 2 мм
- Вытяжение ретенированных 8 – х зубов

Коэффициент 1.5.

- Закрытие промежутка после удаления зуба на нижней челюсти в процессе ортодонтического лечения при отсутствии скученности зубов

Коэффициент 2.

- Закрытие промежутка на месте зуба, удаленного более шести месяцев назад
- Лечение скелетных форм неправильного прикуса без хирургического вмешательства.

В случае совпадения нескольких категорий применяется правило: от категории с большим значением коэффициента берется коэффициент целиком, от других – десятые; их значения суммируются, например: $2,0 + 0,2 = 2,2$.